

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a KAEG Zrt. (9023 Győr, Corvin u. 9.) által képviselt Bakonyerdő Zrt., Budapesti Erdőgazdaság Zrt., DALERD Zrt., DINPI, Egererdő Zrt., Északerdő Zrt., Gemenc Zrt., Gyulaj Zrt., Ipoly Erdő Zrt., KAEG Zrt., KEFAG Zrt., KASZÓ Zrt., Mecsekerdő Zrt., Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., NEFAG Zrt., Nyírerdő Zrt., Pilis Parkerdő Zrt., SEFAG Zrt., SM Consulting Kft., Szombathelyi Erdészeti Zrt., TAEG Zrt., VADEX Zrt., VERGA Zrt., Vértesserdő Zrt., Zalaerdő Zrt. ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére:

- A **Calaris Pro** (50 g/l meotrion + 326 g/l terbutilazin) gyomirtó szer a hatályos engedélykirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészeti kultúrákban (bükk, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, csertölgy, fekete dió és egyéb elegy fafajokban) és erdészeti vágásterületek kezelésére magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva
és
- A **Pulsar 40 SL** (40 g/l imazamox) gyomirtó szer a hatályos engedélykirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészeti területeken akác magvetésekben, csemete ültetésekben és csemetekerti magvetésekben, továbbá másod-, és harmadéves erdősítések területein magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

valamint

- A **Stomp Aqua** (455 g/l pendimetalin) gyomirtó szer a hatályos engedélykirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdősítésekben és csemetekertekben (kocsányos tölgy és egyéb elegy fafajok) makkvetésekben magról kelő egyszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

2025. március 1-től 2025. június 28-ig

- A **Click Combi** (265 g/l dimetenamid-P + 300 g/l terbutilazin) gyomirtó szer a hatályos engedélykirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, csertölgy, első-, másod- és harmadéves erdősítésekben, makkvetésekben és csemetekertekben magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

továbbá

- A **Proman** (500 g/l metobromuron) gyomirtó szer a hatályos engedélykirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészeti kultúrákban (csertölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, nemes nyár, hazai nyár, magas kőris, magyar kőris fajokban) magról kelő kétszikű gyomnövények elleni földi permetezéssel kijuttatva

2025. március 15-től 2025. július 12-ig

és

- A **Monsoon Active** (31,5 g/l foramszulfuron + 10 g/l tienkarbazon + 15 g/l ciproszulfamid) gyomirtó szer a hatályos engedélykirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy és csertölgy erdőfelújításokban magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények, valamint fásszárú gyomok (pl. som) ellen, továbbá másodéves és idősebb kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, csertölgy, bükk és fekete dió, valamint egyéb elegyfajok alkotta erdősítésekben a magról kelő egy- és kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

2025. március 20-tól 2025. május 18-ig

és

2025. augusztus 15-től 2025. október 13-ig

- A **Medallon Premium** (360 g/l glifozát) gyomirtó szer a hatályos engedélykirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészeti kultúrákban, erdészeti területeken a vágásterületek kezelésére, réteken, legelőkön, gyepterületeken és ruderaliákon magról kelő egy- és kétszikű, illetve évelő gyomnövények, valamint inváziós fajok és inváziós lágyszárú növényfajok ellen földi permetezéssel kijuttatva

és

- A **Mezzo** (200 g/kg metszulfuron-metil) gyomirtó szer a hatályos engedélykirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészeti kultúrák, erdészeti vágásterületek, ruderaliák, valamint erdészeti területek, rétek, legelők, gyepterületek kezelésére a teljes engedélyezett időszakban magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények, inváziós fajok és inváziós lágyszárú növényfajok ellen földi permetezéssel kijuttatva

2025. március 20-tól 2025. április 10-ig

illetve

2025. április 20-tól 2025. május 10-ig

továbbá

2025. július 10-től 2025. szeptember 24-ig

- A **Banvel 480 S** (480 g/l dikamba) gyomirtó szer a hatályos engedélykirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészeti vágásterületek kezelésére fagyal, som, orgona és egyéb kétszikű lágyszárú és fásszárú gyomok ellen földi permetezéssel kijuttatva

és

- A **Dezormon** (600 g/l 2,4 D) gyomirtó szer a hatályos engedélykirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását bükk erdőfelújításokban, valamint másod- és harmadéves erdősítésekben magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények és cserjék ellen földi permetezéssel kijuttatva

továbbá

- A **Tropotox XT** (400 g/l MCPB) gyomirtó szer a hatályos engedélykirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását másodéves vagy idősebb kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy és csertölgy erdőfelújításokban, valamint erdészeti vágásterületek kezelésére zöld juhar, vadszőlő és egyéb magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva

2025. június 15-től 2025. október 12-ig

engedélyezi.

Felhasználható az ügyfél saját felelősségére:

- A **Banvel 480 S** gyomirtó szer felhasználható erdészeti vágásterületek kezelésére fagyal, som, orgona és egyéb kétszikű lágyszárú és fásszárú gyomok ellen 0,5-0,7 l/ha dózisban, 200-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. A készítményhez felületi feszültségcsökkentő és tapadást elősegítő adalékanyag kombinálása javasolt. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!
- A **Calaris Pro** gyomirtó szer felhasználható erdészeti kultúrákban (bükk, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, csertölgy, fekete dió és egyéb elegy fafajokban) magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények elleni védekezésre 2,3 l/ha dózisban, 20-200 l/ha permetlével földi kijuttatással. Makkvetésekben a kezeléseket közvetlenül a vetés után a makkok kicsírázása előtt kell elvégezni. Későbbi időpontban a kezelés fitotoxikus tüneteket okozhat. Másod- és harmadéves erdősítésekben kora tavasszal, rügypattanás előtt kell a kezeléseket elvégezni. A készítményhez felületi feszültségcsökkentő és tapadást elősegítő adalékanyag hozzáadása javasolt. A készítmény kijuttatását sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!
Vágásterületek kezelésére a teljes engedélyezett időszakban felhasználható magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen 2,3 l/ha dózisban, 20-200 l/ha permetlével földi kijuttatással. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!
- A **Click Combi** felhasználható kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, csertölgy, első-, másod- és harmadéves erdősítésekben, makkvetésekben és csemetekertekben magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények elleni védekezésre, 2,5 l/ha dózisban, 20-200 l/ha permetlével földi kijuttatással. Makkvetésekben a kezeléseket közvetlenül a vetés után a makkok kicsírázása előtt kell elvégezni. Későbbi időpontban a kezelés fitotoxikus tüneteket okozhat. Első-, másod- és harmadéves erdősítésekben kora tavasszal, rügypattanás előtt kell a kezeléseket elvégezni. A készítményhez felületi feszültségcsökkentő és tapadást elősegítő adalékanyag hozzáadása javasolt. A készítmény kijuttatását sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!
- A **Dezormon** gyomirtó szer felhasználható bükk erdőfelújításokban magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények és cserjék elleni védekezésre 1,0-1,2 l/ha dózisban, 20-200 l/ha permetlével földi kijuttatással. Másod- és harmadéves erdősítésekben kora tavasszal, rügypattanás előtt kell a kezeléseket elvégezni. A bükk erdőfelújításokban a csemeték rügypattanása után a kezelés árnyékolóval ellátott permetezőgéppel végezhető. A készítményhez felületi feszültségcsökkentő és

tapadást elősegítő adalékanyag kombinálása javasolt. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel vagy sorkezeléssel kell elvégezni, a terület gyomosodásának mértéke szerint, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!

- A **Medallon Premium** gyomirtó szer felhasználható erdészeti területeken a vágásterületek kezelésére legkésőbb az erdőtelepítés előtt 1-2 héttel kijuttatva 3,0-5,0 l/ha dózisban 250-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. Bármely fafaj telepítése előtt használható gyom- és cserjeirtásra. Olyan növények esetén, amelyek termése fogyasztásra kerülhet (pl. szeder, málna, áfonya, bodza) a kezelést virágzás előtt, vagy a gyümölcsök leszedését vagy a gyümölcshullást követően lehet elvégezni. Ettől eltérő időpontban való kezelés esetén biztosítani kell, hogy a termés nem kerül fogyasztásra. Vadon termő gyógynövények esetén biztosítani kell, hogy a kezelést követően nem kerülnek begyűjtésre.

A készítmény kijuttatását foltkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!

- A **Medallon Premium** gyomirtó szer felhasználható erdészeti kultúrákban, kizárólag másodéves és idősebb bükk, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, csertölgy és elegyes lombos erdősítésekben kora tavasszal, nyugalmi állapotban, a célkultúra rügyeinek pattanása előtt, az első felmelegedés után földi szeder, hamvas szeder és vadrózsa ellen, 4,0 l/ha dózisban, 200-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. Az elegyes lombos fafajokon végzett kezelések előtt érzékenységi vizsgálatokat kell végezni. A gyomirtó hatás fokozása céljából tapadásfokozó adalékanyag hozzáadása javasolt. A célkultúra rügyeinek kibomlását követően a fitotoxikus veszély miatt a kezelés csak árnyékolóval ellátott permetezőgéppel, a csemetesorok mellett végezhető.

A készítmény kijuttatását foltkezeléssel vagy sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!

- A **Medallon Premium** felhasználható erdészeti területeken, réteken, legelőkön, gyepterületeken és ruderaliákon 50 %-os vagy 75 %-os oldat formájában inváziós fafajok (elsősorban bálványfa, akác, zöld juhar, nyugati osterfa, kései meggy, amerikai kőris) törzsén injektálással (1 ml/furatonként), a célnövény fa körpalástján egymástól maximum 15 cm távolságra készített furatokba.

Illetve a készítmény felhasználható a felsorolt inváziós fafajok kéreg, szár, tuskó felületére hosszú szárú ecsettel történő kenéssel, 31,8 %-os olajos festett emulzióban.

Továbbá a készítmény felhasználható inváziós lágyszárú növényfajok (selyemkóró, japánkeserűfű, alkörmös) szárán, levelén hosszú szárú ecsettel vagy kenőgéppel történő kenéssel, 33 %-os vizes oldatban.

Valamint felhasználható árnyékolóval ellátott permetezőgéppel invazív lágyszárú és fásszárú növények sarjak pontpermetezésére 10 %-os oldat formájában. Legfeljebb a terület egyharmada kezelhető! A készítményből a hektáronként kijuttatott glifozát hatóanyag mennyiség nem haladhatja meg a 2160 grammot.

A készítmény nem alkalmazható termő gyümölcsfák, cserjék és szőlő közelében. Ilyen környezetben a kezelést a termés leszedése után a hűvösebb kora őszi időszakban célszerű elvégezni. A készítmény nem alkalmazható akácerdőkben, akác erdősítésekben, az akác fokozott érzékenysége miatt.

- A **Mezzo** gyomirtó szer felhasználható erdészeti vágásterületek, és ruderaliák kezelésére a teljes engedélyezett időszakban magról kelő és élő kétszikű gyomnövények ellen, 40-100 g/ha dózisban, 20-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. A gyomirtó hatás fokozása céljából tapadásfokozó adalékanyag és ammónium-szulfát műtrágya hozzáadása javasolt. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!
- A **Mezzo** gyomirtó permetezőszer felhasználható erdészeti kultúrákban (2 éves és idősebb bükk, tölgy, cser, és elegyes lombos állományokban), magról kelő és élő kétszikű gyomnövények ellen, kora tavasszal a célkultúra rügyeinek pattanása előtt az első felmelegedések után 40-100 g/ha dózisban. Az elegyes lombos fafajokon végzett kezelések előtt érzékenységi vizsgálatokat kell végezni. Mesterséges erdőfelújításokban a célkultúra rügyeinek kibomlását követően a fitotoxikus

veszély miatt a kezelés csak árnyékolóval ellátott permetezőgéppel, a csemetesorok mellett végezhető. A tankkeverékhez felületi feszültségcsökkentő illetve tapadást elősegítő adalékanyag használata tilos. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel vagy sorkezeléssel kell elvégezni, a terület gyomosodásának mértéke szerint 20-300 liter/ha permetlé felhasználásával. Legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!

- A **Mezzo** felhasználható erdészeti területeken, erdősítésekben, réteken, legelőkön, gyepterületeken és ruderaliákon 1%-os oldat formájában inváziós fafajok (elsősorban bálványfa, akác, zöld juhar, nyugati ostorfa, kései meggy, amerikai kőris) törzsén injektálással (1 ml/furatonként), a célnövény fa körpalástján egymástól maximum 15 cm távolságra készített furatokba.

Illetve a készítmény felhasználható a felsorolt inváziós fafajok kéreg, szár, tuskó felületére hosszú szárú ecsettel történő kenéssel, 0,5%-os olajos festett emulzióban.

Továbbá felhasználható lágyszárú növényfajok (selyemkóró, japánkeserűfű, alkörmös) szárán, levelén hosszú szárú ecsettel, vagy kenőgéppel történő kenéssel, 0,5 %-os olajos oldatban.
- A **Monsoon Active** gyomirtó szer felhasználható kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy és csertölgy erdőfelújításokban posztemergensen magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények, valamint fasszárú gyomok (pl. som) ellen osztott kezeléssel 1,0 l/ha + 1,2 l/ha dózisban földi kijuttatással. A kezeléseket akkor lehet elvégezni, amikor a kulturnövény befejezte az aktív növekedést. A két kezelés között 7-10 napnak kell eltelnie. A permetezéseket földi gépes kijuttatással kell elvégezni, a terület gyomosodásának mértéke szerint 200-400 l/ha permetlé felhasználásával. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel vagy sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!
- A **Monsoon Active** gyomirtó szer felhasználható másodéves és idősebb kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy és csertölgy, bükk és feketedió, valamint egyéb elegyfajok alkotta erdősítésekben magról kelő egy- és kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények ellen, kora tavasszal a célkultúra rügyeinek pattanása előtt, az első felmelegedések után 2,0 l/ha dózisban földi kijuttatással. A célkultúra rügyeinek kibomlását követően a fitotoxikus veszély miatt a kezelés csak árnyékolóval ellátott permetezőgéppel, a csemetesorok mellett végezhető. A készítmény kijuttatását sorkezeléssel kell elvégezni, a terület gyomosodásának mértéke szerint 20-400 liter/ha permetlé felhasználásával. Legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!
- A **Proman** gyomirtó szer felhasználható erdészeti kultúrákban (csertölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, nemes nyár, hazai nyár, magas kőris, magyar kőris fafajokban) magról kelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésre 3,0-4,0 l/ha dózisban, 200-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. Makkvetésekben a kezeléseket közvetlenül a vetés után a makkok kicsírázása előtt kell elvégezni. Későbbi időpontban a kezelés fitotoxikus tüneteket okozhat. Másod- és harmadéves erdősítésekben kora tavasszal, rügypattanás előtt kell a kezeléseket elvégezni. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel vagy sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!
- A **Pulsar 40 SL** gyomirtó szer felhasználható erdészeti területeken akác magvetésekben, csemete ültetésekben és csemetekerti magvetésekben, továbbá másod-, és harmadéves erdősítések területein magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen 1,0 l/ha dózisban, 20-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. Magvetésekben a kezeléseket közvetlenül a vetés után a magok kicsírázása előtt kell elvégezni. Későbbi időpontban a kezelés fitotoxikus tüneteket okozhat. Másod- és harmadéves erdősítésekben kora tavasszal, rügypattanás előtt kell a kezeléseket elvégezni. A készítményhez felületi feszültségcsökkentő és tapadást elősegítő adalékanyag kombinálása javasolt. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel vagy sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!

- A **Stomp Aqua** gyomirtó szer felhasználható erdősítésekben és csemetekertekben (*kocsányos tölgy és egyéb elegy fajok*) makkvetésekben magról kelő egyszikű gyomnövények ellen 3,5 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével vetés után, kelés előtt, preemergensen, földi kijuttatással. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel vagy sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető! A készítmény elsősorban a magról kelő egyszikűek és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény ellen hatékony. *Az évelőket, valamint a fészkesvirágzatúak, keresztesek, burgonyafélék, mályvafélék családjába tartozó gyomnövényeket nem irtja.*
- A **Tropotox XT** másodéves vagy idősebb kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy és csertölgy erdőfelújításokban felhasználható zöld juhar, vadszőlő és egyéb magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen posztemergensen, levélviaszosodás után 2,0-4,0 l/ha dózisban, 200-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel vagy sorkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!
Vágásterületek kezelésére a teljes engedélyezett időszakban felhasználható zöld juhar, vadszőlő és egyéb magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen 2,0-4,0 l/ha dózisban, 200-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. A készítmény kijuttatását foltkezeléssel kell elvégezni, legfeljebb a terület egyharmada kezelhető!

Valamennyi készítménynél az erdészeti területeken való felhasználás során minden esetben törekedni kell a korlátozott méretű területre való kijuttatásra!

A gyomirtó szer hatékonyságáról és szelektivitásáról a kérelmező köteles elektronikus úton az alábbi linken elérhető táblázat kitöltésével ([Adatbekérő herbicid hatékonysági és szelektivitási információkról](#)) adatokat szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok felhasználásonként legalább 2 területről).

A *kezelt területeken* előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges.

Az ügyfél a jelen határozat alapján köteles a felhasznált növényvédő szer készletekről az engedélyező hatóság részére legkésőbb 2025. november 30-ig jelentést készíteni.

Az ügyfél köteles a felhasznált készletekről szóló jelentésében táblázatban összesíteni a kezelt területet, és az ezekről készített összesítő táblázatot az engedélyező hatóság részére megküldeni az aschenbrennerp@nebih.gov.hu email címre.

A hatóság az adatszolgáltatásra kötelezettel szemben 15 napos „türelmi időt” adhat.

Amennyiben a fentieknek nem tesz eleget, figyelmeztetem, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 60. § (1) bekezdés o) pontja alapján **növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki** az e törvény, valamint e törvény végrehajtására kiadott rendeletben, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában előírt **adatszolgáltatási, nyilvántartási, nyilvántartásba vételi kötelezettségének nem tesz eleget**, melynek az Éltv. 59. § (3) bekezdése szerint legmagasabb összege százötvenmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint.

A készítmények szükséghelyzeti felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.

A hatósági eljárás díja 1.650.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül az engedélyező hatósághoz kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton a <http://anyk.nebih.gov.hu> oldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

Tájékoztatatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.

Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Indokolás

”A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2025. február 25.

Dr. Nemes Imre

elnök

nevében és megbízásából:

Szűcs Csaba

igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél/Ügyfél meghatalmazottja-elektronikusan
2. Irattár