


Seltima[®] - „A rizsre fejlesztett gombaölőszer”

Termékprofil, formuláció

Hatóanyag:	piraklostrobin 100 g/l
Hatóanyag csoport:	strobilurin (QoI)
Formuláció:	SC, kapszulázott szuszpenzió

Seltima[®] kapszula



- 1 Levélen**
 - Erős megtapadás a levél felületén
 - A kapszulából gyorsan feltáródik a hatóanyag
 - A hatóanyag gyorsan beszívódik a növénybe
- 2 Vízben**
 - Kapszulák zárva maradnak, minimális a hatóanyag feltáródás
 - Kapszulák az iszapba süllyednek
- 3 Iszapban**
 - A kapszula a nedves iszaphoz kötődik
 - A száraz iszapban lebomlik a termék

Engedélyezés

Rizs és indián rizs kultúrában engedélyezett.

Földi géppel és légi kijuttatás is.

Engedélyezett dózis: 1,0 l/ha.

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Élelmezés egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges.

Forgalmazási kategória: II.

Seltima[®] - „A rizsre fejlesztett gombaölőszer”

Felhasználási javaslat

Javasolt dózis: 1,0 l/ha.


Kijuttatási idő: a betegségek megjelenése előtt megelőző jelleggel vagy az első tünetek megjelenésekor.

Rizs: maximum 2 kezelés/szezon, min. 10 nap a 2 kezelés között, bugahányás közepe (BBCH 43) – teljes virágzás (BBCH 65)

Indiánrizs: maximum 1 kezelés/szezon, bugahányás közepe (BBCH 43) – teljes virágzás (BBCH 65)

Minimum 75% kultúrnövény fedettség esetén lehet kipermetezni.

A rezisztencia elkerülése miatt egymás után 2 kezelés nem javasolt, más típusú gombaölőszerrel célszerű váltani, közbeiktatni.



Kijuttatással kapcsolatos követelmények

Nem ajánlatos kipermetezni, ha egy órán belül eső várható.

Bekeveréssel kapcsolatos szabályok:

Szerves oldószert (pl. EC formuláció) tartalmazó növényvédőszerrel, műtrágyával, adjuvánssal, beépített adjuvánst tartalmazó termékkel nem keverhető egy tartályba.

Több termék bekeverése esetén a Seltima-t utolsóként kell a permetező keverőtartályába önteni.

Seltima[®] - „A rizsre fejlesztett gombaölőszer”

Törzsoldatot nem szabad készíteni, közvetlenül a keverő tartályba kell önteni.
Bekeverés után azonnal fel kell használni.

A légi kijuttatással kapcsolatos szabályok:

EU és hazai légi kijuttatás rendelet szabályait be kell tartani.

Min. 30 nappal a tervezett kijuttatás előtt a légi permetezési tervet be kell nyújtani a megfelelő hatósághoz.

A tényleges kijuttatás előtti napon a NÉBIH-t tájékoztatni kell.

Puffer zónák betartása:

Min. 20 m nem cél kultúrnövénytől.

Min. 100 m nyílt víztől.

Min. 300 m lakott területtől és természetvédelmi területtől.

A felhasználóval kapcsolatos követelmények

A területre a Seltima levélen való teljes megszáradása után lehet bemenni.

Kerülni kell a terméknek bőrrel való közvetlen érintkezését.

Érintkezés után azonnal bő szappanos vízzel kell lemosni.

Engedélyben előírt munkavédelmi eszközök, előírt védőfelszerelés használata kötelező.

Egyéb utókövetéssel kapcsolatos követelmények

Vízi szervezetek tenyésztésének céljára fenntartott táblában tilos felhasználni.

6 hónapnál nem régebben gyártott termék használható fel.

A kezelés után min. 24 órával lehet a tábla vizét leeresztetni.

Más felszíni vagy talajban lévő vizet nem szabad Seltima-val vagy a permetező tartály mosólével szennyezni.